Eat Well, Live Well
AJINOMOTO®



グルタミン酸入り葉面散布剤

グルハート®

グルハート®

環境ストレスを受けやすい露地野菜に最適！

曇天・低温時の生育不良を改善するグルタミン酸入り。

馬鈴薯（品種：男爵）

■希釈倍率：200倍希釈
■散布時期：6月下旬～7月上旬
着蕾期、開花期、開花終期、
塊茎肥大期×2（合計5回）

【結果】①規格内重量（2L～M）：13%増加
②ライマン価（Lサイズ）：20%増加（12.1→15.4）



慣行区　「グルハート®」区

タマネギ（品種：北海天心）

■希釈倍率：200倍希釈
■散布時期：6月24日（鱗茎肥大開始期）
7月8日、23日、30日、8月8日、15日（合計6回）

【結果】規格内重量（2L～M）：7%増加

（単位：kg）

	2L	L大	L	M	合計
慣行区	0	4.951	11.156	2.774	18.881
グルハート	1.746	4.878	9.925	3.648	20.197



慣行区　「グルハート®」区

根菜類	馬鈴薯、タマネギ、ゴボウ、ニンニク、ナガイモ、ニンジン 等
果樹類	ミカン、リンゴ、ブドウ、モモ、梨 等
鉢　物	パンジー、ビオラ、プリムラ、ペチュニア 等

葉菜類	コマツナ、ホウレン草、レタス、ネギ、ニラ、キャベツ 等
花　卉	キク、トルコギキョウ、バラ、カーネーション、カスミソウ 等
その他	お茶、水稲、麦類 等

こんな時にお使い下さい



- 曇りの日が続き作物の生育が悪い
- 生育を早めたい
- 低温で作物の生育が悪い
- 収穫物の実入りを良くしたい


標準的施用方法

◆10aあたりグルハート500mℓ～1ℓを水で200～500倍に希釈し、葉面散布で施用して下さい。
◆施用回数は開花後、月2～3回が目安です。
◆施用量や施用回数、希釈倍率は生育の具合を見ながら増減して下さい。

荷姿
20kg
バッグイン
ボックス



グルハート®を使うタイミング（馬鈴薯の場合）



数を増やしたい時：開花前に散布
実を大きくしたい時、実に養分を増やしたい時：開花後（着果後）に散布

肥料登録番号：生第93803号　肥料の種類：副産複合肥料
保証成分：窒素全量 3.8%（内アンモニア性窒素 2.5%）、
加里全量 1.2%（内水溶液加里 1.2%）

製造 味の素株式会社　販売 味の素ヘルシーサプライ株式会社

味の素ヘルシーサプライ農業 検索
http://www.ahs.ajinomoto.com/business/agli.html

〒104-0031 東京都中央区京橋二丁目17番11号
TEL（03）3563-7580 FAX（03）3567-0059
メールアドレス shiryou_ahs@ajinomoto.com