

高品質なばれいしょ生産に貢献する BASFの農薬ラインナップ

殺虫剤

天然由来の吸汁阻害剤、
アブラムシ防除に新提案！


セフィーナ[®] DC

DC製剤による葉組織内への浸達性が優れた
対雨性と長期残効性を実現！



残効性 およそ3週間の残効性を示します。

■ばれいしょのジャガイモヒゲナガアブラムシに対する経時サンプリングによる残効性評価



【試験概要】 社内試験 BASFジャパン (株)
アグソリューションファーム成東

- 作物(品種)：ばれいしょ(男爵)
- 区制：1区1株、3反復
- 対象害虫：ジャガイモヒゲナガアブラムシ
- 処理方法：茎葉散布
- 試験条件：ポット植えのばれいしょに薬剤を散布した。薬剤散布当日、1日後、8日後、14日後、20日後にポットから葉を採取し、ジャガイモヒゲナガアブラムシ幼虫を1葉当たり10頭接種した。接種後約7日後に防除率を求めた。

殺菌剤

異なる作用機作の**2成分**で疫病菌のほぼ全てのステージを阻害

ザンプロDM[®]フロアブル



BASFジャパン株式会社

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号
OVOL日本橋ビル3階
☎ 0120-014-660
<https://crop-protection.basf.co.jp>

®=BASF社の登録商標

■ - BASF

We create chemistry